

Jakość narybku szklatego węgorza europejskiego (*Anguilla anguilla*) sprowadzanego w celu jego podchowu

Stanisław Robak¹, Piotr Przystawik², Piotr Chmieleński¹, Robert Stabiński²

¹Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

²Polski Związek Wędkarski, Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

W celu podchowu narybku wstępującego i obsadowego węgorza w styczniu 2010 r. do obiektu wylęgarniczo-pochowowego w Guziance (Gospodarstwo Rybackie Polskiego Związku Wędkarskiego Suwałki) sprowadzono 80 kg narybku szklatego. W sprowadzonym narybku, według 11-stopniowej skali Strubberga oraz Bertina wyróżniono 7 form należących do 2 stadiów (V i VI) pigmentacji narybku. Najliczniejszą grupę stanowiły osobniki formy o zaawansowanej pigmentacji VIA_I (46,03%) oraz nieco słabiej wybarwione w stadium VB (18,52%). Pozostałe 4 formy (VIA_{II}, VIA_{III}, VIA_{VI}, VIB) o większej liczbie melanoforów stanowiły łącznie 22,75%. Długość ciała narybku mieściła się w zakresie od 61 do 80 mm, zaś masa ciała wynosiła od 0,1801 do 0,4518 g.